

Pratiques exemplaires de manipulation du lait lors d'une exposition de bovins

Pour réduire la propagation des maladies (comme l'influenza aviaire hautement pathogène [IAHP] A [H5N1]) à d'autres animaux ou dans l'environnement lors d'expositions de vaches en lactation, il faut mettre en place des mesures de prévention pour manipuler en toute sécurité le lait collecté.

Voici quelques pratiques exemplaires :

Vous devez traire des bovins?

Le lait doit provenir de bovins dont les tests de détection de l'influenza H5N1 se sont avérés négatifs et qui ne présentent AUCUN signe clinique de mammite (lait de couleur douteuse, caillots, grumeaux, enflure, sang).



Lavage et désinfection

Laver et désinfecter l'unité de traite après chaque animal.



Traitement thermique avant l'élimination

Traiter thermiquement (pasteuriser) le lait avant de le jeter. Ne pas offrir de lait cru aux visiteurs, ni à d'autres animaux.



En l'absence de pasteurisation

Si le lait n'est pas collecté en vrac pour être éliminé et que la pasteurisation n'est pas disponible durant l'exposition, entreposer le lait dans des contenants scellés et le rapporter à la ferme d'origine pour qu'il soit jeté.



Interaction entre humains et animaux

Limiter les contacts directs des humains et des autres espèces animales avec le lait et les bovins. Les activités comme « Venez traire une vache » sont à proscrire.



Biosécurité et manipulation du lait

Suivre le protocole de biosécurité en matière de manipulation du lait prévu pendant l'exposition.

