



SantéAnimaleCanada

Volaille urbaine

À FAIRE ET À NE PAS FAIRE

L'élevage de volaille urbaine peut être une expérience enrichissante, mais elle s'accompagne de responsabilités pour prévenir les maladies et assurer la santé de votre troupeau. Ce guide présente les pratiques clés pour assurer la biosécurité et éviter les pièges courants.

Assurer la propreté et une bonne gestion des déchets



Nettoyez régulièrement votre poulailler, votre équipement et vos matériaux de nidification. Lavez-vous les mains après avoir manipulé des oiseaux ou des œufs. Éliminez adéquatement les oiseaux morts afin d'éviter les charognards.

Mettre les nouveaux oiseaux en quarantaine



Isolez les nouveaux oiseaux pendant au moins 30 jours avant de les introduire dans votre troupeau afin d'empêcher la propagation de maladies possibles.

Surveiller la santé et signaler les problèmes




Surveillez les signes de maladie ou le comportement inhabituel des oiseaux et signalez rapidement toute préoccupation à votre vétérinaire.



Éviter le contact avec des oiseaux sauvages ou d'autres animaux

Évitez d'exposer votre troupeau à des oiseaux sauvages, des rongeurs ou d'autres animaux. N'installez pas la volaille avec d'autres animaux d'élevage pour prévenir la propagation de maladies.



Ne pas utiliser d'eau contaminée

Réduisez au minimum l'accès aux étangs, aux ruisseaux et aux eaux de surface non traitées ou potentiellement contaminées. Donnez toujours de l'eau fraîche propre.



Ne pas oublier de prendre des notes

Tenez toujours des registres détaillés sur les achats et les ventes de volaille, et l'historique de vaccination pour le dépistage des maladies.