



Garder vos oiseaux en santé



NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

1. Nettoyage à sec de routine après chaque troupeau

- **Enlèvement des matières organiques**
 - Brossez, grattez et pelletez le fumier, les plumes, la litière et les débris.
 - Concentrez-vous sur le nettoyage des coins, des fissures et de la saleté incrustée, car les germes peuvent s'y cacher.
- **Outils de nettoyage à sec**
 - Utilisez des grattoirs, des balais et des pelles réservés aux zones avicoles et entreposez les outils dans un endroit propre et sec après leur utilisation.
- **Élimination des déchets**
 - Évitez de contaminer le milieu environnant pendant les activités d'élimination en éliminant correctement la litière utilisée, conformément aux règlements locaux.

2. Nettoyage et désinfection en profondeur pendant l'année

Prévoyez un nettoyage et une désinfection en profondeur au moins une ou deux fois par année.

- **Étapes de nettoyage en profondeur**
 - **Préparation de l'enclos**
 - Déplacez les oiseaux dans un endroit sûr.
 - Enlevez toutes les matières organiques restantes.
 - **Nettoyage à l'eau (pendant le nettoyage en profondeur prévu)**
 - Frottez les surfaces avec de l'eau et du détergent.
 - Travaillez systématiquement de haut en bas et d'arrière en avant.
 - Rincez soigneusement à l'eau propre.
 - **Application de désinfectant**
 - Utilisez un désinfectant efficace (p. ex., approuvé pour les maladies aviaires comme l'influenza aviaire hautement pathogène [IAHP] et la salmonelle).
 - Suivez l'étiquette pour connaître la dilution et la méthode d'application à utiliser.
 - Concentrez-vous sur les coins, les fissures et les endroits difficiles d'accès.
 - **Séchage**
 - Laissez l'enclos sécher complètement avant de ramener les oiseaux.

3. Vide sanitaire

- Prévoyez des périodes de vide sanitaire pendant l'année, où vous laissez l'enclos vide afin de réduire la survie des agents pathogènes dans l'environnement. Cette étape est particulièrement efficace pour contrôler les maladies comme l'IAHP et la coccidiose.

4. Maladies nécessitant un nettoyage et une désinfection.

- Certaines maladies aviaires exigent un nettoyage et une désinfection stricts en raison de leur persistance dans l'environnement ou du risque élevé de propagation. Des exemples sont l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), la maladie de Newcastle, la salmonelle, la mycoplasmosse, la coccidiose, le choléra aviaire et la bursite infectieuse.

5. Tâches quotidiennes et hebdomadaires

- **Chaque jour :**
 - Enlevez l'eau et les aliments renversés pour éviter d'attirer des organismes nuisibles ou de causer une accumulation d'humidité. Assurez-vous que le fumier ne s'accumule pas de façon excessive.
- **Chaque semaine ou chaque mois :**
 - Vérifiez la propreté des nichoirs, des perchoirs et des coins. Nettoyez les zones qui sont visiblement sales.

6. Équipement de protection individuelle (EPI)

- **Équipement réservé à cet effet**
 - Utilisez des bottes, des gants et des vêtements spécialement pour travailler avec la volaille.
 - Lavez l'EPI réutilisable ou jetez les articles à usage unique après le nettoyage.
- **Lavage des mains**
 - Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon après avoir nettoyé ou manipulé les déchets.

7. Désinfectants recommandés et pratiques exemplaires

- Mélangez 1 part d'eau de Javel avec 10 parts d'eau ou utilisez la solution Virkon, en suivant les instructions du fabricant.
- Versez généreusement le désinfectant sur la zone pour assurer une couverture adéquate et laissez-le reposer pendant au moins 10 minutes ou le temps précisé par le fabricant pour neutraliser les virus.
- Mettez des bottes réservées à cet effet ou désinfectez vos chaussures avant d'entrer dans l'enclos.
- Effectuez le nettoyage en profondeur pendant les mois chauds pour profiter d'un séchage plus rapide.
- Tenez les animaux de compagnie, les enfants et les autres animaux à l'écart de la zone traitée jusqu'à ce qu'elle soit sèche.